

2015年5月19日

各 位

会 社 名 第 一 三 共 株 式 会 社  
代 表 者 代 表 取 締 役 社 長 中 山 讓 治  
( コ ー ド 番 号 4 5 6 8 東 証 第 1 部 )  
問 合 せ 先 常 務 執 行 役 員 コ ー ポ レ ー ト コ ミ ュ ニ ケ ー シ ョ ン 部 長 石 田 憲 昭  
TEL 報 道 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1126  
株 式 市 場 関 係 者 の 皆 様 03-6225-1125

**「インフルエンザHAワクチン“化血研”に関する  
販売提携契約締結について**

第一三共株式会社（本社：東京都中央区、以下「当社」）と、一般財団法人化学及血清療法研究所（本所：熊本市北区、以下「化血研」）は、化血研が製造販売する「インフルエンザHAワクチン“化血研”」（以下、「本ワクチン」）について、2015年5月18日付で、販売提携契約（以下「本契約」）を締結しましたことをお知らせいたします。

本ワクチンは、季節性インフルエンザの予防に使用される鶏卵由来不活化ワクチンです。当社は、本契約にもとづき、次期（2015-2016）シーズンより本ワクチンの販売活動を開始する予定です。

なお当社は、現在販売しているインフルエンザHAワクチン「北里第一三共」についても、販売を継続していきます。

当社は、本ワクチンを通して、季節性インフルエンザの更なる予防に取り組むとともに、引き続き、医療ニーズに合致したワクチンを通じて、日本の保健衛生の向上ならびに予防医療の環境充実と普及に努め、人々の健康を守ることに貢献してまいります。

## 製品概要

販売名	インフルエンザ HA ワクチン “化血研”
一般名	インフルエンザ HA ワクチン
製剤の規制区分	生物由来製品、劇薬、処方箋医薬品（注意－医師等の処方箋により使用すること）
規格・含量	瓶入 1mL：2本
効能・効果	インフルエンザの予防
用法・用量	6ヶ月以上3歳未満のものには0.25mLを皮下に、3歳以上13歳未満のものには0.5mLを皮下におよそ2～4週間の間隔をおいて2回注射する。13歳以上のものについては、0.5mLを皮下に、1回又はおよそ1～4週間の間隔をおいて2回注射する。
製造販売元	一般財団法人 化学及血清療法研究所
販売元	第一三共株式会社
販売提携	ジャパンワクチン株式会社

以 上